Boletim de Farmacovigilância

Ariane Máximo[1]; Caroline Carvalho[1]; Luiz Gustavo Fonseca[1]; Mariany Vitoriano[1]
[1]Graduandos do curso de Farmácia da Universidade Federal de São João del-Rei

Segundo a Interfarma, o Dorflex® é o medicamento mais vendido no Brasil. [1]

Da classe dos relaxantes musculares, o Dorflex® é bastante utilizado contra dores musculares e dores de cabeça tensionais. É composto por dipirona, orfenadrina e cafeína.[2]

Por ser um Medicamento Isento de Prescrição (MIP), sua utilização é exacerbada. No entanto, deve-se tomar alguns cuidados na utilização desse medicamento.

"Nenhum medicamento é seguro, no entanto, há maneiras seguras de usá-los"

Sempre procure um médico e/ou farmacêutico antes de usar algum medicamento.

Efeitos adversos possíveis na utilização de Dorflex®

O objetivo do boletim é a alertar os usuários de Dorflex® sobre as reações adversas que ele pode causar, bem como a sua composição e a finalidade do uso.

Por combinar dipirona com orfenadrina e cafeína, Dorflex® possui ação analgésica e também é relaxante muscular.[3] Entretanto, mesmo com estes benefícios, o Dorflex pode causar alguns efeitos adversos. Abaixo segue-se alguns os principais eventos adversos relacionados ao medicamento. [3]

Principais reações adversas ao uso de Dorflex®	
✓ Visão desfocada	✓ Tontura
✓ Dor abdominal	✓ Dor de cabeça
✓ Náusea	✓ Tremor
✓ Edema	✓ Urticária
✓ Pressão sanguínea elevada	✓ Pressão arterial baixa

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), essas reações adversas relacionadas ao Dorflex® podem ser divididas em faixa etária. [3]



Além disso, há ocorrência de outros eventos adversos. Dentre eles estão: secura na boca, redução ou aumento do ritmo cardíaco, batimentos irregulares do coração, palpitações, sede, diminuição do suor, dificuldade em urinar, visão embaçada, pupila dilatada, aumento da pressão dentro do olho, fraqueza, enjoo, vômito, dor de cabeça, tontura, prisão de ventre, sonolência, reações de alergia, coceira, alucinações, agitação, tremor, irritação no estômago com sintomas como dor no estômago e sensação de estômago cheio[4].

Referências

[1]Revista Guia da Farmácia
[2]Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA
[3]Centro de Monitoramento Uppsala - UMC
[4]BVS – Atenção Primária Básica: Quais as complicações do uso indiscriminado de analgésicos e relaxantes musculares?

Universidade Federal de São João del-Rei - Campus Centro-Oeste
Curso de Farmácia – 3º período
Farmacoepidemiologia

Divinópolis-MG

 Todos os direitos reservados ©. Junho de 2019.