


OBS: A associação de medicamentos nicotínicos com não nicotínicos dobram as chances de sucesso do tratamento.

 **O Tratamento deve ser realizado por meio do orientação de um profissional de saúde (médico, farmacêutico).**

RECAÍDA

Risco para recaída: fracasso em tentativas anteriores, outros fumantes na residência ou trabalho, circunstância de vida estressante, baixa motivação.

Pacientes que tiveram recaída não devem desistir do tratamento.


É importante uma reavaliação do tratamento escolhido e a realização de uma nova tentativa.



LIGA ACADÊMICA
DE FARMÁCIA CLÍNICA



INFLUÊNCIA DO TABACO NO USO DE MEDICAMENTOS E MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA CESSAÇÃO DO TABAGISMO



 @LAFARC_UFSJ

 LAFARC

 ACESSE NOSSO SITE!
WWW.UFSJ.EDU.BR/LAFARC

O QUE É O TABAGISMO

É reconhecido como uma doença crônica causada pela dependência à nicotina presente nos produtos à base de tabaco.

DOENÇAS RELACIONADAS

O tabagismo está relacionado com diversas doenças e ao aumento da mortalidade em comparação com não fumantes. As mais comuns são: câncer de pulmão, doença pulmonar obstrutiva crônica, doença cardiovascular e úlcera peptídica.

 **Fumantes passivos também estão sujeitos aos riscos.**

INTERAÇÃO COM MEDICAMENTOS

A nicotina, princípio ativo do tabaco, possui interação com diversos remédicos, como por exemplo a insulina, verapamil, codeína e alprazolam. dessa forma, antes de iniciar um tratamento sempre busque orientação de um profissional qualificado para que não aconteça problemas.

CESSAÇÃO DO TABAGISMO

O tabagismo traz inúmeros malefícios à saúde. Por isso, A Organização Mundial da Saúde recomenda sua cessação. Assim, para as pessoas que manifestarem desejo em parar de fumar, é importante seja de acordo com seu interesse e com acompanhamento profissional.

TRATAMENTO

NÃO MEDICAMENTOSO: terapia ocupacional, visando identificar gatilhos relacionados ao desejo de fumar. É realizada através de técnicas cognitivas e de modificação do comportamento para interromper a associação entre a situação gatilho, a fissura de fumar e o comportamento de consumo.

MEDICAMENTOSO:

- Nicotínicos: adesivo transdérmico, goma de mascar, pastilha, spray nasal, comprimido sublingual.
- Não nicotínicos: Bupropiona (fármaco de primeira escolha), Vareniclina, Nortriptilina e Clonidina.

