Brezolini, N.M.R.M. O cirurgião dentista e o comportamento suicida [Dissertação]. Divinópolis: Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de São João Del-Rei; 2021.

RESUMO

Introdução: O suicídio é um fenômeno complexo e universal, que pode ser definido como uma violência auto infligida, levado até o fim por uma pessoa com total conhecimento ou expectativa de pôr fim a algo ou a uma situação. É um problema para a saúde pública e consequentemente para a atenção básica. O dentista por possuir um vínculo com seus pacientes pode ser o primeiro a testemunhar os sinais do comportamento suicida. **Objetivo:** descrever a conduta do cirurgião dentista frente ao comportamento suicida. **Métodos:** Trata-se de um estudo de cunho exploratório descritivo com abordagem quantitativa. A coleta de dados aconteceu por meio de um grupo de Whatsapp, intitulado "Dentistas de Divinópolis". Esse grupo que foi criado em 07 de agosto de 2014 e possui 10 profissionais que são administradores do grupo e 256 profissionais. O contato inicial se deu através de uma mensagem enviada no particular de cada membro desse grupo. A mensagem contou com uma breve explicação sobre o projeto e em seguida um link para que eles pudessem ter acesso ao termo de consentimento, ao questionário sociodemográfico (composto de 15 questões com o objetivo de caracterizar os participantes bem como essas características em relação ao comportamento suicida.) e o Questionário de Atitudes em Relação ao Comportamento Suicida (QUACS). **Resultados:** Participaram dessa pesquisa 86 cirurgiões dentistas, porém 9 (nove) não responderam de forma correta/completa, sendo assim desconsiderados e a análise foi realizada considerando a resposta de 77 profissionais. Dos 77 que responderam completamente, 40 eram do sexo masculino (51,9%), 68,8% eram casados ou união estável e 62 (80,5%) se declararam brancos. 51 (66,2%) possuíam especialização, a maioria 83,1% trabalha no setor privado, 39,0% possuíam até 5 anos de formação e 74 (96,1%) nunca receberam um curso/capacitação sobre a temática. 42 (54,5%) foram formados sob a perspectiva da nova DCN.Os dados do QUACS revelam que encontrou-se diferença entre solteiro/divorciado e casado no fator 3 – Direito ao suicídio ($p = 0,038$). Os solteiros/divorciados têm um maior score indicando que esse grupo tem o julgamento mais moralista com relação a esse assunto. **Conclusões:** Esse trabalho se torna relevante, uma vez que o QUACS é utilizado pela primeira vez com cirurgiões dentistas. Outro ponto, que como se trata de uma pesquisa inédita a nível nacional relacionada ao suicídio e o cirurgião dentista. A odontologia tem uma formação ainda pouco voltada para as questões da saúde mental, assim acredita-se que esse estudo trará um novo olhar para essa formação profissional, bem como uma mudança no olhar do contexto do comportamento suicida.

DESCRITORES: Suicídio. Dentista. Profissional da saúde. Tentativa de suicídio. Odontologia. Formação profissional

Brezolini, N.M.R.M. The dental surgeon and suicidal behavior [Dissertation]. Divinópolis: Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de São João Del-Rei; 2021.

ABSTRACT

Introduction: Suicide is a complex and universal phenomenon, which can be defined as self-inflicted violence, carried out to the end by a person with full knowledge or expectation of putting an end to something or a situation. It is a problem for public health and consequently for primary care. The dentist, having a bond with his patients, may be the first to witness the signs of suicidal behavior. **Objective:** describe the conduct of dental surgeon in face of suicidal behavior. **Methods:** This is an exploratory descriptive study with a quantitative approach. Data collection took place through a Whatsapp group, entitled "Dentistas de Divinópolis". This group was created on August 7, 2014 and has 10 professionals who are group administrators and 256 professionals. The initial contact took place through a message sent in private from each member of that group. The message had a brief explanation about the project and then a link so they could have access to the consent form, the sociodemographic questionnaire (composed of 15 questions in order to characterize the participants as well as these characteristics in relation to suicidal behavior) and the Attitudes towards Suicidal Behavior Questionnaire (QUACS). **Results:** 86 dentists participated in this research, but 9 (nine) did not answer correctly/completely, thus being disregarded and the analysis was carried out considering the answers of 77 professionals. Of the 77 who answered completely, 40 were male (51.9%), 68.8% were married or in a stable relationship and 62 (80.5%) declared themselves white. 51 (66.2%) had specialization, the majority 83.1% work in the private sector, 39.0% had up to 5 years of training and 74 (96.1%) had never received a course/ training on the subject. 42 (54.5%) were trained under the perspective of the new DCN. The QUACS data reveal that a difference was found between single/divorced and married in factor 3 -Right to suicide ($p = 0.038$). Singles/divorced individuals have a higher score indicating that this group has the most moral judgment regarding this issue. **Conclusions**: This work becomes relevant since the QUACS is used for the first time with dental surgeons. Another point, that as this is an unprecedented survey at a national level related to suicide and the dentist. Dentistry has a training that is still little focused on mental health issues, so it is believed that this study will bring a new look to this professional training, as well as a change in the look of the context of suicidal behavior.

KEYWORDS: Suicide. Dentists. Health personnel. Suicide attempted. Dental. Professional training

Brezolini, N.M.R.M. El cirujano dentista y la conducta suicida [Disertación]. Divinópolis: Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de São João Del-Rei; 2021.

RESUMEN

Introducción: El suicidio es un fenómeno complejo y universal, que puede definirse como violencia autoinfligida, llevada a cabo hasta el final por una persona con pleno conocimiento o expectativa de poner fin a algo o situación. Es un problema para la salud pública y, en consecuencia, para la atención primaria. El dentista, que tiene un vínculo con sus pacientes, puede ser el primero en presenciar los signos de un comportamiento suicida. **Objetivo:** describir la conducta del cirujano dentista ante la conducta suicida. **Métodos:** Se trata de un estudio descriptivo exploratorio con enfoque cuantitativo. La recogida de datos se realizó a través de un grupo de Whatsapp, denominado "Dentistas de Divinópolis". Este grupo fue creado el 7 de agosto de 2014 y cuenta con 10 profesionales que son administradores de grupo y 256 profesionales. El contacto inicial se produjo a través de un mensaje enviado en privado por cada miembro de ese grupo. El mensaje tenía una breve explicación sobre el proyecto y luego un enlace para que tuvieran acceso al formulario de consentimiento, el cuestionario sociodemográfico (compuesto por 15 preguntas para caracterizar a los participantes así como estas características en relación a la conducta suicida) y el Cuestionario de Actitudes hacia la Conducta Suicida (QUACS). **Resultados:** En esta investigación participaron 86 odontólogos, pero 9 (nueve) no respondieron correcta / completamente, por lo que fueron descartados y el análisis se realizó considerando las respuestas de 77 profesionales. De los 77 que respondieron completamente, 40 eran hombres (51,9%), 68,8% estaban casados o en una relación estable y 62 (80,5%) se declararon blancos. 51 (66,2%) tenían especialización, la mayoría 83,1% trabaja en el sector privado, 39,0% tenía hasta 5 años de formación y 74 (96,1%) nunca había recibido un curso / formación sobre el tema. 42 (54.5%) fueron capacitados bajo la perspectiva de la nueva DCN Los datos de QUACS revelan que se encontró diferencia entre solteros / divorciados y casados en el factor 3 - Derecho al suicidio ($p = 0.038$). Los solteros / divorciados tienen una puntuación más alta, lo que indica que este grupo tiene el mayor juicio moral con respecto a este tema. **Conclusiones:** Este trabajo cobra relevancia ya que el QUACS se utiliza por primera vez con cirujanos dentales. Otro punto, que ya que se trata de una encuesta sin precedentes a nivel nacional relacionada con el suicidio y el dentista. La Odontología tiene una formación que aún está poco enfocada a temas de salud mental, por lo que se cree que este estudio aportará una nueva mirada a esta formación profesional, así como un cambio en la mirada del contexto de la conducta suicida.
.

PALABRAS CLAVE: Suicidio. Dentista. Profesional de la salud. Intento de suicídio. Odontología. Formación profesional